



## Hasmenés megelőzése malackorban

GYÓGYSZERES TAKARMÁNYOZÁST KÖVETŐ IDŐSZAKRA

Gyógyszeres malac takarmányok használata általános a nagyüzemi gyakorlatban. Gyakran találkozunk erősen agresszív hatású készítmények alkalmazásával, mint pl. a magas cink-tartalmú takarmányok használata és ilyenek az antibiotikumok is.

Az ilyen medikációk egyaránt pusztítják a bélflóra káros és hasznos lakóit, és amikor befejeződik a gyógyszeres takarmány etetése, az eredeti egészséges bélflórának ismét helyre kellene állnia. Úgy is mondhatjuk, hogy újra kell kolonizálnia.

Ez egy nehéz folyamat és előfordulhat, hogy a hasmenést okozó baktériumok kerülnek túlsúlyba, és ismét megjelenik a hasmenés.

### Kinek ajánljuk?

Azoknak a telepeknek ajánljuk, ahol gyógyszeres takarmányokat alkalmaznak, vagy azoknak a telepeknek, ahol a kitűnő higiéniai és tartástechnológiai viszonyok miatt gyógyszer használatára ugyan nincs szükség, de biztonsági okokból megelőzést szeretnének végezni.

### Etetésének célja:

- Emésztőszervi betegségek megelőzése,
- Gyógyszerfelhasználás racionalizálása,
- Nagyobb tömeggyarapodás,
- Kevesebb kiesés.

**Költségek:** ColiStar: 2,90-4,30Ft/kg malac táp, vagy 90-120Ft/malac.

**Extrák:** Az egészség megőrzése nagyobb napi gyarapodással és jobb takarmány értékesüléssel jár együtt.

### Etetési javaslat:

Malac takarmányokban 2-3 kg/tonna bekeverésben használva a gyógyszerelés befejezését követő naptól számolva. Etetése mindaddig javasolt, amíg a hasmenés veszélye fennáll.

Hízó sertésekkel, süldőkkel is etethető főleg a hizlaldába telepítés időszakában, 1-2kg/tonna táp mennyiségben.

**Termék:**

# ColiStar

A **ColiStar** etetése segít helyreállítani a bélflórát, átsegíteni a malac egészségét ezen a nehéz időszakon, és megelőzni a betegséget. Használatával a gyógyszerelés előbb, és nagyobb biztonsággal hagyható el.

Ugyanezen elvek igazak idősebb sertéseknél is.

